

重 要

- 対象年齢の数え方：対象年齢の「～歳（か月）に至るまで」「～未満」とは、「～歳（か月）」になる1日前までの接種になります。
- 対象年齢、接種回数、接種間隔を外れると自己負担（有料）になりますので、ご注意ください。

は標準的な接種年齢

種 類	接 種 対 象 年 齢	方 法
ヒブ ※接種開始年齢 によって接種 回数が異なり ます。	生後2か月～ 7か月に至るまで	4回接種 <p>○ 初回1回目 27日以上 ※1</p> <p>○ 初回2回目 27日以上 ※1※3</p> <p>○ 初回3回目 7月以上 ※2※3</p> <p>○ 追加(4回目)</p> <p>※1 標準的には56日までの間隔（医師が認めた場合は20～56日） ※2 標準的には13月までの間隔 ※3 初回2回目・3回目は1歳に至るまでに行い、それを越えた場合は行わない。この場合も追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日（医師が認めた場合は20日）以上の間隔をおいて1回接種</p>
	生後7か月～ 1歳に至るまで	3回接種 <p>○ 初回1回目 27日以上 ※1</p> <p>○ 初回2回目 7月以上 ※2※3</p> <p>○ 追加(3回目)</p> <p>※1 標準的には56日までの間隔（医師が認めた場合は20～56日） ※2 標準的には13月までの間隔 ※3 初回2回目は1歳に至るまでに行い、それを越えた場合は行わない。この場合も追加接種は可能ですが、初回接種の最後の接種終了後27日（医師が認めた場合は20日）以上の間隔をおいて1回接種</p>
	1歳～5歳に至るまで	1回接種
小児用肺炎 球菌 ※接種開始年齢 によって接種 回数が異なり ます。	生後2か月～ 7か月に至るまで	4回接種 <p>○ 初回1回目 27日以上</p> <p>○ 初回2回目 27日以上 ※1※3</p> <p>○ 初回3回目 60日間以上 ※1※3</p> <p>○ 追加(4回目) ※2</p> <p>※1 初回接種は標準的には1歳までに行う ※2 追加(4回目)の接種年齢は1歳以降。標準として1歳～1歳3か月 ※3 初回2回目・初回3回目の接種は2歳に至るまでに行い、それを越えた場合は行わないこと（追加接種は可能）。また、初回2回目の接種が満1歳を越えた場合、初回3回目の接種は行わないこと（追加接種は可能）</p>
	生後7か月～ 1歳に至るまで	3回接種 <p>○ 初回1回目 27日以上</p> <p>○ 初回2回目 60日間以上 ※1</p> <p>○ 追加(3回目) ※2</p> <p>※1 初回2回目の接種は標準的には1歳までに行う ※2 追加(3回目)の接種年齢は1歳以降。ただし初回2回目の接種は2歳に至るまでに行い、それを越えた場合は行わないこと（追加接種は可能）</p>
	1歳～2歳に至る まで	2回接種 <p>○ 1回目 60日間以上</p> <p>○ 2回目</p>
	2歳～5歳に至るまで	1回接種

種 類	接 種 対 象 年 齢	方 法	
B型肝炎	1歳に至るまで 生後2か月～9か月に 至るまで	3回接種 ○ 1 27日以上 2 1回目の接種から 139日以上 3 回 目 回 目 回 目	
□ タ	1 価 (ロタリックス)	2回接種 ○ 1 27日以上 2 回 目 回 目	※いずれの ワクチンも 1回目を生 後14週6日 後までに接 種すること が推奨され ています。
	5 価 (ロタテック)	3回接種 ○ 1 27日以上 2 27日以上 3 回 目 回 目 回 目	
四種混合 〔百日せき ジフテリア 破傷風 不活化ポリオ〕	生後2か月～7歳6か 月 に至るまで 1期初回： 生後2か月～1歳に 至るまで 1期追加： 初回3回目から1年～ 1年半に至るまで	・1期初回：3回接種 ・1期追加：1回接種 ○ 初 20日以上 初 20日以上 初 6月以上 追 回 回 回 加 1 2 3 (4 回 回 回 回 目 目 目 目) ※1 標準的には56日までの間隔 ※2 標準的には1年～1年半の間隔	
BCG	1歳に至るまで 生後5か月～8か 月 に至るまで	1回接種	
麻しん 風しん 混合	1期 1歳～2歳に至るまで	1回接種 すでに麻しんまたは風しんにかかったことのある子は、かかっていない方の 単抗原ワクチンを接種することも可能です。	
	2期 年長相当時の1年間(4月 1日～翌年3月31日まで)	1回接種 すでに麻しんまたは風しんにかかったことのある子は、かかっていない方の 単抗原ワクチンを接種することも可能です。	
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳に至るまで 1回目：1歳～1歳3か 月 に至るまで 2回目：1回目から6月 ～1年 に至るまで	2回接種 ○ 1 3月以上 2 回 目 回 目 ※1 ※1 標準的には6月～1年の期間	
日本脳炎	1期 生後6か月～7歳6か 月 に至るまで 1期初回：3歳 (3歳からの接種をお勧 めします) 1期追加：4歳	・1期初回：2回接種 ・1期追加：1回接種 ○ 初 6日以上 初 6月以上 追 回 回 加 1 2 3 回 回 回 目 目 目 ※1 標準的には28日までの間隔 ※2 標準的にはおおむね1年の間隔	